

## 1 Vektorji in matrike

1.1 Vektor je urejena  $n$ -terica števil, ki jo običajno zapisemo kot stolpec

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

1.2 Produkt vektorja  $\vec{x}$  s skalarjem  $\alpha$  je vektor

$$\alpha \vec{x} = \alpha \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{bmatrix}$$

1.3 Vsota vektorjev  $\vec{x}$  in  $\vec{y}$  je vektor

$$\vec{x} + \vec{y} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix}$$

1.4 Nicelni vektor  $\vec{0}$  je tisti vektor, za katerega je  $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$  za vsak vektor  $\vec{a}$ . Vse komponente nicelnega vektorja so enake 0. Vsakemu vektorju  $\vec{a}$  pripada nasprotni vektor  $-\vec{a}$ , tako da je  $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$ . Razlika vektorjev  $\vec{a}$  in  $\vec{b}$  je vsota  $\vec{a} + (-\vec{b})$  in jo navadno zapisemo kot  $\vec{a} - \vec{b}$ .

**Lastnosti vektorske vsote**

- $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$  (komutativnost)
- $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$  (asociativnost)
- $a(\vec{a} + \vec{b}) = a\vec{a} + a\vec{b}$  (distributivnost)

1.5 Linearna kombinacija vektorjev  $\vec{x}$  in  $\vec{y}$  je vsota

$$a\vec{x} + b\vec{y}$$

1.6 Skalarni produkt vektorjev

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ in } \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \text{ je število}$$

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

alternativno:

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = |\vec{x}| |\vec{y}| \cos \phi$$

**Lastnosti skalarnega produkta**

- $\vec{x} \cdot \vec{y} = \vec{y} \cdot \vec{x}$  (komutativnost)
- $\vec{x} \cdot (\vec{y} + \vec{z}) = \vec{x} \cdot \vec{y} + \vec{x} \cdot \vec{z}$  (aditivnost)
- $\vec{x} \cdot (a\vec{y}) = a(\vec{x} \cdot \vec{y}) = (a\vec{x}) \cdot \vec{y}$  (homogenost)
- $\forall \vec{x}$  velja  $\vec{x} \cdot \vec{x} \geq 0$

1.7 Dolžina vektorja  $\vec{x}$  je

$$|\vec{x}| = \sqrt{\vec{x} \cdot \vec{x}}$$

1.8 Enotski vektor je vektor z dolžino 1.

1.9 Za poljubna vektorja  $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$  velja:

$$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq |\vec{u}| |\vec{v}|,$$

enakost velja, v primeru, da sta vektorja vzporedna.

1.10 Za poljubna vektorja  $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$  velja:

$$|\vec{u} + \vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|.$$

1.11 Vektorja  $\vec{x}$  in  $\vec{y}$  sta ortogonalna (pravokotna) natančno takrat, kadar je

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = 0$$

1.12 Če je  $\phi$  kot med vektorjema  $\vec{x}$  in  $\vec{y}$ , potem je

$$\frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{|\vec{x}| |\vec{y}|} = \cos \phi$$

1.13 Vektorski produkt:

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2) \vec{i} + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \vec{j} + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \vec{k}$$

**Lastnosti vektorskega produkta**

- $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$  (aditivnost)
- $\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}$  (lkomutativnost)
- $(a\vec{a}) \times \vec{b} = a(\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \times (a\vec{b})$  (homogenost)
- $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$
- $\vec{a} \times \vec{b}$  je  $\perp$  na vektorja  $\vec{a}$  in  $\vec{b}$
- $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \phi$

• Dolžina vektorskega produkta je plosčina paralelograma, katerega vektorja oklepata

1.14 Mesani produkt  $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$  vektorjev  $\vec{a}, \vec{b}$  in  $\vec{c}$  v  $\mathbb{R}^3$  je skalarni produkt vektorjev  $\vec{a} \times \vec{b}$  in  $\vec{c}$ :

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

**Lastnosti mesanega produkta**

- $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}) = (\vec{c}, \vec{a}, \vec{b})$
- $(\vec{x}\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = x(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$  (homogenost)
- $(\vec{a}, \vec{u} + \vec{v}, \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{u}, \vec{c}) + (\vec{a}, \vec{v}, \vec{c})$

• Absolutna vrednost mesanega produkta  $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$  je enaka prostornini paralepipeda

**Premice v  $\mathbb{R}^3$**

Premico določata smerni vektor  $\vec{p} = [a, b, c]^T$  in točka  $A(x_0, y_0, z_0)$ .

- Parametrična oblika  $\vec{r} = \vec{r}_A + t\vec{p}$ ,  $t \in \mathbb{R}$

$$\bullet \text{ Kanonična oblika } \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

**Ravnine v  $\mathbb{R}^3$**

Ravnina z normalo  $\vec{n} = [a, b, c]^T$  skozi točko  $A(x_0, y_0, z_0)$  ima enačbo

$$(\vec{r} - \vec{r}_A) \cdot \vec{n} = 0$$

oziroma

$$ax + by + cz = d$$

**Razdalje**

Razdalja od točke  $P$  do ravnine, v kateri leži točka  $A$ :

$$\cos \phi = \frac{\vec{n} \cdot (\vec{r}_P - \vec{r}_A)}{|\vec{n}| |\vec{r}_P - \vec{r}_A|} \text{ oz. } d = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{r}_P - \vec{r}_A)|}{|\vec{n}|}$$

Razdalja od točke  $P$  do premice, katere gre skozi točko  $A$ :

$$d = \frac{|\vec{e} \times (\vec{r}_P - \vec{r}_A)|}{|\vec{e}|}$$

**Projekcija vektorjev**

Naj bo  $\text{proj}_{\vec{a}} \vec{b}$  =  $\vec{x}$  projekcija vektorja  $\vec{b}$  na vektor  $\vec{a}$ . Izračunamo jo po sledenci formuli:

$$\text{proj}_{\vec{a}} \vec{b} = \frac{\vec{a} \vec{b}}{\vec{a} \vec{a}} \vec{a}$$

1.15 Matrika dimenzije  $m \times n$  je tabela  $m \times n$  števil, urejenih v  $m$  vrstic in  $n$  stolpcih:

$$A^{m \times n} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & x_{m3} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

1.16 Matrika, katere elementi so enaki nič povsod zunaj glavne diagonale, se imenuje diagonalna matrika. Za diagonalno matriko je  $a_{ij} = 0$ , kadarkoli velja  $i \neq j$

1.17 Matrika  $A^{n \times n}$  je spodnjetrokotna, kadar so vsi elementi nad glavno diagonalo enaki 0:

$$a_{ij} = 0 \text{ kadar je } i < j$$

1.18 Matrika  $A^{n \times n}$  je zgornjetrokotna, kadar so vsi elementi pod glavno diagonalo enaki 0:

$$a_{ij} = 0 \text{ kadar je } i > j$$

1.19 Matrika je trikotna, ce je zgornjetrokotna ali spodnjetrokotna.

1.20 Dve matriki  $A$  in  $B$  sta enaki natanko takrat, kadar imata enaki dimenziji in kadar so na istih mestih v obeh matrikah enaki elementi:

$$A^{m \times n} = B^{p \times q} \implies m = p \text{ in } n = q, \text{ } a_{ij} = b_{ij} \text{ za vsak } i = 1, \dots, m \text{ in } j = 1, \dots, n$$

1.21 Produkt matrike s skalarjem dobimo tako, da vsak element matrike pomnožimo s skalarjem

$$aA^{m \times n} = \begin{bmatrix} a x_{11} & a x_{12} & a x_{13} & \dots & a x_{1n} \\ a x_{21} & a x_{22} & a x_{23} & \dots & a x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a x_{m1} & a x_{m2} & a x_{m3} & \dots & a x_{mn} \end{bmatrix}$$

1.22 Vsoto dveh matrik enake dimenzije dobimo tako, da sestevamo istolezne elemente obeh matrik:

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m3} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

**Osnovne matricne operacije**

- $A + B = B + A$  (komutativnost)
- $(A + B) + C = A + (B + C)$  (asociativnost)
- $a(A + B) = aA + aB$  (množenje s skalarjem)
- $A + (-A) = 0$
- $x(yA) = (xy)A$  in  $1 \cdot A = A$

1.23 Transponirana matrika k matriki  $A$  reda  $m \times n$  je matrika reda  $n \times m$

$$A = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{21} & \dots & x_{m1} \\ x_{12} & x_{22} & \dots & x_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1n} & x_{2n} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

**Lastnosti transponiranja matrik**

- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$
- $(xA)^T = xA^T$
- $(A^T)^T = A$

1.24 Produkt matrike  $A$  in vektorja  $\vec{x}$  je linearna kombinacija stolpcev matrike  $A$ , uteži linearne kombinacije so komponente vektorja  $\vec{x}$ :

$$A\vec{x} = \begin{bmatrix} \vec{u} & \vec{v} & \vec{w} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$$

1.25 Produkt vrstice  $\vec{x}$  z matriko  $A$  je linearna kombinacija vrstic matrike  $A$ , koeficienti linearne kombinacije so komponente vrstice  $\vec{y}$ :

$$\vec{y} \cdot A = [y_1, y_2, y_3] \cdot \begin{bmatrix} \vec{u} \\ \vec{v} \\ \vec{w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \vec{u} \\ y_2 \vec{v} \\ y_3 \vec{w} \end{bmatrix}$$

1.26 Produkt matrik  $A$  in  $B$  je matrika, katere stolpci so zaporedoma produkti matrike  $A$  s stolpci matrike  $B$ :

$$AB = A [b_1, b_2, \dots, b_n] = [Ab_1, Ab_2, \dots, Ab_n]$$

1.27 Element  $c_{ij}$  v  $i$ -ti vrstici in  $j$ -tem stolpcu produkta  $C = AB$  je skalarni produkt  $i$ -te vrstice  $A$  in  $j$ -tega stolpca matrike  $B$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

1.28 Produkt matrik  $A$  in  $B$  je matrika, katere vrstice so zaporedoma produkti vrstic matrike  $A$  z matriko  $B$ :

$$[i - \text{ta vrstica } A] B = [i - \text{ta vrstica } AB]$$

**Lastnosti matricnega produkta**

- $AB \neq BA$  (ikomutativnost)
- $(xA)B = x(AB) = A(xB)$  (homogenost)
- $C(A + B) = CA + CB$  (distributivnost)
- $A(BC) = (AB)C$  (asociativnost)
- $(AB)^T = B^T A^T$

V splošnem; komutativnost matricnega množenja velja samo, ko sta matriki diagonalizabilni.

1.29 Vrstice matrike  $A$  z  $n$  stolpci naj bodo  $a^1, \dots, a^n$ , stolpci matrike  $B$  z  $n$  vrsticami pa  $b_1, \dots, b_n$ . Potem je

$$AB = a^1 b_1 + \dots + a^n b_n$$

1.30 Če delitev na bloke v matriki  $A$  ustreza delitvi v matriki  $B$ , potem lahko matriki pomnozimo bločno:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} B_{11} + A_{12} B_{21} & A_{11} B_{12} + A_{12} B_{22} \\ A_{21} B_{11} + A_{22} B_{21} & A_{21} B_{12} + A_{22} B_{22} \end{bmatrix}$$

1.31 Kvadratna matrika  $I_k$  reda  $k \times k$ , ki ima vse diagonalne elemente enaki 1, vse ostale elemente pa 0 ima lastnost, da za vsako matriko  $A$  reda  $m \times n$  velja  $A I_n = A$  in  $I_m A = A$ . Matrika  $I_k$  se imenuje enotska ali identična matrika.

$$I_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

## 2 Sistemi linearnih enač

2.1 Kvadratna matrika  $A$  je obrnljiva, ce obstaja taka matrika  $A^{-1}$ , da je

$$A A^{-1} = I \text{ in } A^{-1} A = I$$

Matrika  $A^{-1}$  (ce obstaja) se imenuje matrika  $A$  inverzna matrika. Matrika, ki ni obrnljiva, je singularna. Matrika  $NI$  obrnljiva, kadar je  $\text{rang}(A) < n$ !

2.2 Kvadratna matrika reda  $n$  je obrnljiva natanko tedaj, ko pri gaussovi eliminaciji dobimo  $n$  pivotov.

2.3 Vsaka obrnljiva matrika ima eno samo inverzno matriko.

2.4 Inverzna matrika inverzne matrike  $A^{-1}$  je matrika  $A$

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

2.5 Če je matrika  $A$  obrnljiva, potem ima sistem enač  $A\vec{x} = \vec{b}$  edino rešitev  $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$

2.6 Če obstaja nenicelna rešitev  $\vec{x}$  enače  $A\vec{x} = \vec{0}$ , matrika  $A$  ni obrnljiva (je singularna).

2.7 Če sta matriki  $A$  in  $B$  istega reda obrnljivi, je obrnljiv tudi produkt  $A \cdot B$  in

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

**Pozor! Pravilo**

$$(AB)^P = A^P B^P$$

velja le v primeru, ko matriki  $A$  in  $B$  komutirata, torej  $AB = BA$ .

2.8 Inverz transponirane matrike je transponirana matrika inverza

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

2.9 Inverz diagonalne matrike z diagonalnimi elementi  $a_{ii}$  je diagonalna matrika, ki ima na diagonalni elemente  $a_{ii}^{-1}$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & \ddots & & \\ & & a_{nn} & \\ 0 & & & \ddots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}^{-1} & & & \\ & \ddots & & \\ & & a_{nn}^{-1} & \\ & & & \ddots \end{bmatrix}$$

2.10 Za izracun inverza matrike  $A$ , uporabimo gausovo eliminacijo nad matriko  $[A|I]$

$$[A|I] = [I|A^{-1}]$$

2.11 Matrika  $A$  je simetrična  $\Leftrightarrow A^T = A$ . Za elemente  $a_{ij}$  simetricne matrike velja  $a_{ij} = a_{ji}$ . Za simetricno matriko vedno velja, da je kvadratna  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ .

2.12 Če je matrika  $A$  simetricna in obrnljiva, je tudi  $A^{-1}$  simetricna.

2.13 Če je  $R$  poljubna (lahko tudi pravokotna) matrika, sta  $R^T R$  in  $R R^T$  simetricni matriki.

## 3 Vektorski prostori

3.1 Realni vektorski prostor  $V$  je množica "vektorjev" skupaj z pravili za

- seštevanje vektorjev,
- množenje vektorja z realnim številom (skalarjem)

Ce sta  $\vec{x}$  in  $\vec{y}$  poljubna vektorja v  $V$ , morajo biti v  $V$  tudi

- vsota  $\vec{x} + \vec{y}$  in
- produkti  $\alpha \vec{x}$  za vse  $\alpha \in \mathbb{R}$

V vektorskem prostoru  $V$  morajo biti tudi VSE linearne kombinacije  $\alpha \vec{x} + \beta \vec{y}$

**Pravila za operacije v vektorskih prostorih**

Operaciji seštevanja vektorjev in množenja vektorja s skalarjem v vektorskem prostoru morajo zadoscati naslednjim pravilom:

- $\vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$  (komutativnost)
- $\vec{x} + (\vec{y} + \vec{z}) = (\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z}$  (asociativnost)
- obstaja en sam nenični vektor  $\vec{0}$ , da velja  $\vec{x} + \vec{0} = \vec{x}$
- za vsak  $\vec{x}$  obstaja natanko en  $-\vec{x}$ , da je  $\vec{x} + (-\vec{x}) = \vec{0}$
- $1 \cdot \vec{x} = \vec{x}$
- $(\alpha \beta) \vec{x} = \alpha(\beta \vec{x})$
- $\alpha(\vec{x} + \vec{y}) = \alpha \vec{x} + \alpha \vec{y}$  (distributivnost)
- $(\alpha + \beta) \vec{x} = \alpha \vec{x} + \beta \vec{x}$

3.2 Podmnozica  $U$  vektorskega prostora  $V$  je vektorski podprostor, ce je za vsak par vektorjev  $\vec{x}$  in  $\vec{y}$  iz  $U$  in vsako realno število  $\alpha$  tudi

- $\vec{x} + \vec{y} \in U$  in
- $\alpha \vec{x} \in U$ .

3.3 Mnozica vektorjev  $U$  je vektorski podprostor natanko tedaj, ko je vsaka linearna kombinacija vektorjev iz  $U$  tudi v  $U$ .

$$R = \begin{bmatrix} 1 & \dots & n \text{ enotska matrica} \\ 0 & \dots & m - n \text{ vrstic samih nicel} \end{bmatrix}$$

**3.15** Za vsako matriko  $A$  s polnim vrsticnim rangom  $r = m \leq n$  velja:

- Vse vrstice so pivotne, ni prostih vrstic in  $U$  (stopnicasta oblika) in  $R$  (reducirana stopnicasta oblika) nimata nicelnih vrstic
- Sistem enacb  $A\vec{x} = \vec{b}$  je resljiv za vsak vektor  $\vec{b}$
- Sistem  $A\vec{x} = \vec{b}$  ima  $n-r = n-m$  prostih neznan, zato tudi prav toliko posebnih rešitev
- Stolpčni prostor  $C(A)$  je ves prostor  $R^m$

**3.16** Za vsako kvadratno matriko  $A$  polnega ranga ( $\text{rang}(A) = m = n$ ) velja:

- Reducirana vrstična oblika matrice  $A$  je enotska matrika
- Sistem enacb  $A\vec{x} = \vec{b}$  ima natančno eno rešitev za vsak vektor desnih strani  $\vec{b}$
- Matrika  $A$  je obrnljiva
- Nicelni prostor matrice  $A$  je samo nicelni vektor  $N(A) = \{\vec{0}\}$
- Stolpčni prostor matrice  $A$  je cel prostor  $C(A) = R^m$

**3.17** Vektorji  $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$  so linearno neodvisni, ce je

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n$$

edina njihova linearna kombinacija, ki je enaka vektorju  $\vec{0}$ . Vektorji  $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$  so linearno odvisni, ce niso linearno neodvisni.

**3.18** Ce so vektorji odvisni, lahko vsaj enega izrazimo z ostalimi.

**3.19** Ce je med vektorji  $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n$  tudi nicelni vektor, so vektorji linearno odvisni.

**3.20** Vsaka množica  $n$  vektorjev iz  $R^n$  je odvisna, kadar je  $n > m$ .

**3.21** Stolpci matrice  $A$  so linearno neodvisni natanko tedaj, ko ima homogena enacba  $A\vec{x} = \vec{0}$  edino rešitev  $\vec{x} = \vec{0}$ .

**3.22** Kadar je  $\text{rang}(A) = n$ , so stolpci matrice  $A \in R^{m \times n}$  linearno neodvisni. Kadar je pa  $\text{rang}(A) < n$ , so stolpci matrice  $A \in R^{m \times n}$  linearno odvisni.

**3.23** Kadar je  $\text{rang}(A) = m$ , so vrstice matrice  $A \in R^{m \times n}$  linearno neodvisne. Kadar je pa  $\text{rang}(A) < m$ , so vrstice matrice  $A \in R^{m \times n}$  linearno odvisne.

**3.24** Vrstični prostor matrice  $A$  je podprostor  $v R^n$ , ki ga razpenjajo vrstice matrice  $A$ .

**3.25** Vrstični prostor matrice  $A$  je  $C(A^T)$ , stolpčni prostor matrice  $A^T$ .

**3.26** Baza vektorskega prostora je množica vektorjev, ki

- je linearno neodvisna in
- napenja cel prostor.

**3.27** Vsak vektor iz vektorskega prostora lahko na en sam način izrazimo kot linearno kombinacijo baznih vektorjev.

**3.28** Vektorji  $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$  so baza prostora  $R^n$  natanko tedaj, kadar je matrika, sestavljena iz stolpcev  $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$ , obrnljiva.

**3.29** Prostor  $R^n$  ima za  $n > 0$  neskončno mnogo različnih baz.

**3.30** Ce sta množici vektorjev  $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m$  in  $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n$  obe bazi istega vektorskega prostora, potem je  $m = n \implies$  vse baze istega vektorskega prostora imajo isto število vektorjev.

**3.31** Dimenzija vektorskega prostora je število baznih vektorjev.

**3.32** Dimenziji stolpčnega prostora  $C(A)$  in vrstičnega prostora  $C(A^T)$  sta enaki rangu matrice  $A$

$$\dim C(A) = \dim C(A^T) = \text{rang}(A).$$

**3.33** Dimenzija nicelnega prostora  $N(A)$  matrice  $A$  z  $n$  stolpci in ranga  $r$  je enaka  $\dim(N(A)) = n - r$ .

**3.34** Stolpčni prostor  $C(A)$  in vrstični prostor  $C(A^T)$  imata oba dimenzijo  $r$ . Dimenzija nicelnega prostora  $N(A)$  je  $n - r$ . Dimenzija levga nicelnega prostora  $N(A^T)$  pa je  $m - r$ .

**3.35** Vsako matriko ranga 1 lahko zapisemo kot produkt(stolpčnega) vektorja z vrstičnim vektorjem  $A = \vec{u}\vec{v}^T$ .

## 4 Linearne preslikave

**4.1** Preslikava  $A : U \rightarrow V$  je linearna, ce velja

- aditivnost:  $A(\vec{u}_1 + \vec{u}_2) = A\vec{u}_1 + A\vec{u}_2$  za vse  $\vec{u}_1, \vec{u}_2 \in U$ ,
- homogenost:  $A(\alpha\vec{u}) = \alpha(A\vec{u})$  za vse  $\alpha \in R$  in  $\vec{u} \in U$ .

Oziroma v enem koraku:

$$A(\alpha\vec{u}_1 + \beta\vec{u}_2) = \alpha A(\vec{u}_1) + \beta A(\vec{u}_2).$$

**Pozor!** Preslikava ni linearna, ce  $A(\vec{0}) \neq \vec{0}$ .

**4.2** Preslikava  $A : U \rightarrow V$  je linearna natanko tedaj, ko velja

$$A(\alpha_1\vec{u}_1 + \alpha_2\vec{u}_2) = \alpha_1 A\vec{u}_1 + \alpha_2 A\vec{u}_2$$

za vse  $\alpha_1, \alpha_2 \in R$  in vse  $\vec{u}_1, \vec{u}_2 \in U$ .

**4.3** Ce je  $A$  linearna preslikava, je  $A\vec{0} = \vec{0}$ . **4.4** Naj bo  $A : U \rightarrow V$  linearna preslikava in  $\sum_{i=1}^k \alpha_i \vec{u}_i$  linearna kombinacija vektorjev. Potem je  $A(\sum_{i=1}^k \alpha_i \vec{u}_i) = \sum_{i=1}^k \alpha_i A\vec{u}_i$ .

**4.5** Naj bo  $\beta = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$  baza za vektorski prostor  $U$ . Potem je linearna preslikava  $A : U \rightarrow V$  natanko določena, ce poznamo slike baznih vektorjev.

**4.6** Naj bo  $\beta = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$  baza za  $U$  in  $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ . Potem obstaja natanko ena linearna preslikava  $A : U \rightarrow V$ , za katero je  $A\vec{u}_i = \vec{v}_i$  za  $i = 1, 2, \dots, n$ .

**4.7** Naj bo  $A : U \rightarrow V$  linearna preslikava. Potem množico

$$\ker A = \{\vec{u} \in U; A\vec{u} = \vec{0}\}$$

imenujemo jedro linearne preslikave. Ker je  $A\vec{0} = \vec{0}$ , je  $\vec{0} \in \ker A$  za vse  $A$ . Zato je jedro vedno neprazna množica. Ce je matrika  $A\phi$  enotska preslikava za  $\phi$ , potem velja

$$\ker \phi = N(A).$$

**4.8** Jedro linearne preslikave  $A : U \rightarrow V$  je vektorski podprostor v  $U$ .

**4.9** Množico

$$\text{im } A = \{\vec{v} \in V; \text{ obstaja tak } \vec{u} \in U, \text{ da je } \vec{v} = A\vec{u}\}$$

imenujemo slika linearne preslikave  $A : U \rightarrow V$ . Ce je matrika  $A\phi$  enotska preslikava za  $\phi$ , potem velja

$$\text{im } \phi = C(A).$$

**4.10** Ce je  $A : U \rightarrow V$  linearna preslikava, potem je njena slika  $\text{im } A$  vektorski podprostor v  $V$ .

**4.11** Ce je  $A : U \rightarrow V$  linearna preslikava, in je rang matrice te preslikave v standardni bazi poln, potem lahko sklepamo, da ima ta preslikava trivialno jedro.

## 5 Ortogonalnost

**5.1** Podprostora  $U$  in  $V$  vektorskega prostora sta med seboj ortogonalna, ce je vsak vektor  $\vec{u} \in U$  ortogonalen na vsak vektor  $\vec{v} \in V$ .

**5.2** Za vsako matriko  $A \in R^{m \times n}$  velja:

- Nicelni prostor  $N(A)$  in vrstični prostor  $C(A^T)$  sta ortogonalna podprostora  $R^n$
- Levi nicelni prostor  $N(A^T)$  in stolpčni prostor  $C(A)$  sta ortogonalna podprostora prostora  $R^m$ .

**5.3** Ortogonalni komplement  $V^\perp$  podprostora  $V$  vsebuje VSE vektorje, ki so ortogonalni na  $V$ . **5.4** Naj bo  $A$  matrika dimenzije  $m \times n$ .

- Nicelni prostor  $N(A)$  je ortogonalni komplement vrstičnega prostora  $C(A^T)$  v prostoru  $R^n$

- Levi nicelni prostor  $N(A^T)$  je ortogonalni komplement stolpčnega prostora  $C(A)$  v prostoru  $R^m$ .

krajse:

$$N(A) = C(A^T)^\perp$$

$$N(A^T) = C(A)^\perp$$

tukaj lahko vedno pomnožimo s komplementom, da dobimo npr.

$$N(A)^\perp = C(A^T)$$

dodatek:

$$\begin{aligned} \dim N(A) &= \text{st. stolpcev} - \text{rang}(A) \\ \dim N(A^T) &= \text{st. vrstic} - \text{rang}(A) \\ \dim C(A) &= \dim C(A^T) = \text{rang}(A) \end{aligned}$$

**5.5** Za vsak vektor  $\vec{y}$  v stolpčnem prostoru  $C(A)$  obstaja in vrstičnem prostoru  $C(A^T)$  en sam vektor  $\vec{x}$ , da je  $A\vec{x} = \vec{y}$ .

**5.6** Ce so stolpci matrice  $A$  linearno neodvisni, je matrika  $A^T A$  obrnljiva.

**5.7** Matrika  $P$  je projekcijska, kadar

- je simetrična:  $P^T = P$  in
- velja  $P^2 = P$ .

**5.8** Ce je  $P$  projekcijska matrika, ki projicira na podprostor  $U$ , potem je  $I - P$  projekcijska matrika, ki projicira na  $U^\perp$ , ortogonalni komplement podprostora  $U$ .

**5.9** Vektorji  $\vec{q}_1, \vec{q}_2, \dots, \vec{q}_n$  so ortonormirani kadar so ortogonalni in imajo vsi dolžino 1, torej

$$\vec{q}_i^T \vec{q}_i = \begin{cases} 0 & \text{ko je } i \neq j \text{ pravokotni vektorji} \\ 1 & \text{ko je } i = j \text{ enotski vektorji} \end{cases}$$

za matriko  $Q = [\vec{q}_1 \ \vec{q}_2 \ \dots \ \vec{q}_n]$  velja  $Q^T Q = I$ .

**5.10** Vektorji  $\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n$  naj bodo ortonormirani v prostoru  $R^n$ . Potem za matriko

$$Q = [\vec{q}_1 \ \vec{q}_2 \ \dots \ \vec{q}_n]$$

velja, da je  $Q^T Q = I_n$  enotska matrika reda  $n$ .

**5.11** Matrika  $Q$  je ortogonalna, kadar je

- kvadratna in
- ima ortonormirane stolpce.

**5.12** Ce je  $Q$  ortogonalna matrika, potem je obrnljiva in

$$Q^{-1} = Q^T \\ \dim U^\perp = n - \dim U \\ (U^\perp)^\perp = U$$

**5.13** Množenje z ortogonalno matriko ohranja dolžino vektorjev in kote med njimi. Ce je  $Q$  ortogonalna matrika, potem je

$$\|Q\vec{x}\| = \|\vec{x}\| \text{ za vsak vektor } \vec{x} \text{ in} \\ (Q\vec{x})^T Q\vec{y} = \vec{x}^T \vec{y} \text{ za vsak vektor } \vec{x} \text{ in } \vec{y}$$

**5.14** Ce sta  $Q_1$  in  $Q_2$  ortogonalni matriki, je tudi produkt  $Q = Q_1 Q_2$  ortogonalna matrika.

**5.15** Gram-Schmidtova ortogonalizacija. Za vhod uporabimo Linearno ogrinjako linearno neodvisnih vektorjev. Po gram-schmidtovi ortogonalizaciji pa dobimo paroma ortogonalne vektorje. Postopek:

$$\begin{aligned} \vec{u}_1 &= \vec{v}_1 \\ \vec{u}_2 &= \vec{v}_2 - \text{proj}_{\vec{u}_1} \vec{v}_2 \\ \vec{u}_3 &= \vec{v}_3 - \text{proj}_{\vec{u}_1} \vec{v}_3 - \text{proj}_{\vec{u}_2} \vec{v}_3 \\ &\vdots \\ &\vdots \end{aligned}$$

Po tem postopku dobimo paroma ortogonalne vektorje po Gram-Schmidtovi ortogonalizaciji.

**5.16 QR Razcep:** Iz linearno neodvisnih vektorjev  $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$  z Gram-Schmidtovo ortogonalizacijo dobimo ortonormirane vektorje  $\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n$ . Matriki  $A$  in  $Q$  s temi stolpci zadostajo enacbi  $A = QR$ , kjer je  $R$  zgornjetrokotna matrika.

- Najprej z Gram-Schmidtovo ortogonalizacijo poiscemo linearno neodvisne vektorje matrice  $A$

- Vektorje normiramo in jih zapisemo v matriko  $Q$ .

- Matriko  $R$  dobimo tako, da matriko  $Q^T$  pomnožimo z matriko  $A$

$$R = Q^T A$$

Tako smo pršli do vseh elementov v QR razcepju matrice  $A$ .

Sedaj ko imamo izracunane vse elemente lahko zapisemo se projekcijsko matriko. To je matrika pravokotne projekcije na  $C(Q) = C(A)$ . Njen izrazec je preprost:

$$QQ^T = \text{pravokotna projekcija na } C(Q) = C(A)$$

Sedaj lahko to projekcijsko matriko pomnožimo z desne s poljubnim vektorjem in ugotovimo kam se preslika v prostoru  $C(A)$ . V nasprotnem primeru, ce bi pa zeleli imeti projekcijsko matriko, s katero bi radi videli kam se vektor preslika v prostoru  $N(A^T)$ , bi pa od identitne matrice odsteli projekcijsko matriko za  $C(Q)$ .

$$I - QQ^T =$$

pravokotna projekcija na  $C(A)^\perp = N(A^T)$

**5.17** Vektorski prostor  $v$  je množica vseh neskončnih zaporedij  $\vec{u}$  s končno dolžino

$$\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = u_1^2 + u_2^2 + \dots < \infty$$

## 5.18 Predoloceni sistemi

$$A^T A \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = A^T \vec{f}$$

Kjer je  $A$  matrika sistemov linearnih enacb in  $\vec{f}$  vektor pričakovanih rešitev po gaussovi eliminaciji zgornje enacbe, dobimo spremenljivke, ki predstavljajo najboljso aproksimacijo vseh kombinacij rezultatov in vhodnih spremenljivk.

## 6 Determinante

**6.1** Determinanta enotske matrice je  $\det(I) = 1$ .

$$\begin{vmatrix} 1 & & 0 \\ 0 & 1 & \dots \\ & & 1 \end{vmatrix} = 1 \text{ in } \begin{vmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

**6.2** Determinanta spremeni predznak, ce med seboj zamenjamo dve vrstici.

**6.3** Determinanta je linearna funkcija vsake vrstice posebej. To pomeni, da se

- determinanta pomnoži s faktorjem  $t$ , ce eno vrstico determinanta (vsak element v tej vrstici) pomnožimo s faktorjem  $t$ .

$$\begin{vmatrix} ta & tb \\ c & d \end{vmatrix} = t \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

- determinanta je vsota dveh determinant, ki se razlikujeta le v eni vrstici, ce je v prvotni determinanti ta vrstica vsota obeh vrstic, ostale vrstice pa so enake v vseh treh determinanti.

$$\begin{vmatrix} a+a' & b+b' \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a' & b' \\ c & d \end{vmatrix}$$

**Pozor!** Kadar množimo matriko  $A$  s skalarmem  $t$ , se vsak element matrice pomnoži s skalarmem  $t$ . Ko racunamo determinanto produkta matrice s skalarmem  $tA$ , skalar  $t$  izpostavimo iz vsake vrstice posebej, zato je  $\det(tA) = t^n \det(A)$ , kjer je  $n$  število vrstic (ali stolpcev) determinante.

**6.4** Matrika, ki ima dve enaki vrstici, ima determinanto enako 0.

**6.5** Ce je matriki od poljubne vrstice odstejemo mnogokratnik neke druge vrstice, se njena determinanta ne spremeni.

**6.6** Naj bo  $A$  poljubna kvadratna matrica  $n \times n$  in  $U$  njena vrstično-stopnicasta oblika, ki jo dobimo z Gaussovo eliminacijo. Potem je

$$\det(A) = \pm \det(U).$$

**6.7** Determinanta, ki ima vrstico samih nicel, je enaka 0.

**6.8** Determinanta trikotne matrice  $A$  je produkt diagonalnih elementov:

$$\det(A) = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}.$$

**6.9** Determinanta singularne matrice je enaka 0, determinanta obrnljive matrice je različna od 0.

**6.10** Determinanta produkta dveh matric je enaka produktu determinant obeh matric:

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

**6.11** Determinanta inverzne matrice je enaka

$$\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$$

in determinanta potence  $A^n$  matrice  $A$  je

$$\det(A^n) = (\det(A))^n$$

ter determinanta transponirane matrice je enaka determinanti originalne matrice, saj ko naredimo razvoj po vrsticah, pridemo do enakih elementov po diagonalni.

$$\det(A) = \det(A^T).$$

**6.12** Transponirana matrika  $A^T$  ima isto determinanto kot  $A$ .

**6.13** Recap dovoljenih operacij nad determinantom

- Ce zamenjamo dve vrstici, se spremeni predznak determinante
- Vrednost determinante se ne spremeni, ce neki vrstici pristemo poljubne vektorratnik katerokoli druge vrstice.
- Ce vse elemente neke vrstice pomnožimo z istim številom  $\alpha$ , se vrednost determinante pomnoži z  $\alpha$ .

**6.14** Vsaka lastnost, ki velja za vrstice determinante, velja tudi za njene stolpce. Med drugim:

- Determinanta spremeni predznak, ce med seboj zamenjamo dva stolpca
- Determinanta je enaka 0, ce sta dva stolpca enaka
- Determinanta je enaka 0, ce so v vsaj enem stolpcu same nicle.

**6.15 (kofaktorska formula)** Ce je  $A$  kvadratna matrika reda  $n$ , njeno determinanto lahko izracunamo z razvojem po  $i$ -ti vrstici

$$\det(A) = a_{i1} C_{i1} + a_{i2} C_{i2} + \dots + a_{in} C_{in}.$$

Kofaktorje  $C_{ij}$  izracunamo kot  $C_{ij} = (-1)^{i+j} D_{ij}$ , kjer je  $D_{ij}$  determinanta, ki jo dobimo, ce v  $A$  izbrisemo  $i$ -to vrstico in  $j$ -ti stolpec.

**6.16** Inverzna matrika  $A^{-1}$  matrice  $A$  je transponirana matrika kofaktorjev, deljena z determinanto  $|A|$ :

$$A^{-1} = \frac{C^T}{\det(A)},$$

kjer je  $C$  matrika kofaktorjev matrice  $A$ .

**6.17** Ploscina paralelograma, določenega z vektorjema  $\vec{a}$  in  $\vec{b} \in R^2$  je enaka  $\det([\vec{a}; \vec{b}])$ , to je absolutni vrednosti determinante s stolpcema  $\vec{a}$  in  $\vec{b}$ .

**6.18** Mesani produkt vektorjev  $\vec{a}$  in  $\vec{b}$  in  $\vec{c}$  je enak determinantu matrice, ki ima te tri vektorje kot stolpce.

**6.19** Naj bo  $A$  matrika  $R^{n \times n}$

$$A \text{ je obrnljiva} \iff \det A \neq 0$$

$$A^{-1} \text{ ne obstaja} \iff \det A = 0$$

## 7 L. vrednosti in vektorji

**7.1** Vektor  $\vec{x} \neq \vec{0}$ , za katerega je  $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$  lastni vektor. Število  $\lambda$  je lastna vrednost. **Pozor!** Nicelni vektor  $\vec{0}$  ne more biti lastni vektor. Lahko pa je lastna vrednost enaka 0.

**7.2** Ce ima matrika  $A$  lastno vrednost  $\lambda$  in lastni vektor  $\vec{x}$ , potem ima matrika  $A^2$  lastno vrednost  $\lambda^2$  in isti lastni vektor  $\vec{x}$ .

**7.3** Ce ima matrika  $A$  lastno vrednost  $\lambda$  in lastni vektor  $\vec{x}$ , potem ima matrika  $A^k$  lastno vrednost  $\lambda^k$  in isti lastni vektor  $\vec{x}$ .

**7.4** Ce ima matrika  $A$  lastno vrednost  $\lambda$  in lastni vektor  $\vec{x}$ , potem ima inverzna matrika lastno vrednost  $1/\lambda$  in isti lastni vektor  $\vec{x}$ .

**7.5** Sled kvadratne mat

zgoranjetrokotna matrika, ki ima lastne vrednosti (lahko so kompleksne) matrike A na diagonalni.

**7.15 Spektralni izrek** Vsako simetrično matriko A lahko razcepimo v produkt  $A = QTQ^T$ , kjer je Q ortogonalna matrika lastnih vektorjev, T pa diagonalna z lastnimi vrednostmi matrike A na diagonalni.

**7.16** Vsako realno simetrično matriko lahko zapisemo kot linearno kombinacijo matrik ranga 1

$$A = \lambda_1 \bar{q}_1 \bar{q}_1^T + \lambda_2 \bar{q}_2 \bar{q}_2^T + \dots + \lambda_n \bar{q}_n \bar{q}_n^T,$$

kjer so  $\bar{q}_i$  stolpci matrike Q (torej lastni vektorji matrike A).

**7.17** Za simetrično nesingularno matriko A je število pozitivnih pivotov enako številu pozitivnih lastnih vrednosti.

**7.18** Kvadratna matrika je pozitivno definitna, kadar so vse njene lastne vrednosti pozitivne.

**7.19** Kvadratna matrika reda 2 je pozitivno definirana natanko tedaj, kadar sta pozitivni sled in determinanta matrike.

**7.20** Simetrična matrika A reda  $n$  je pozitivno definirana natanko tedaj, ko je za vsak vektor  $\bar{x} \neq \bar{0} \in \mathbb{R}^n$

$$\bar{x}^T A \bar{x} > 0$$

**7.21** Če sta matriki A in B pozitivno definitni, je pozitivno definitna tudi njuna vsota  $A + B$ .

**7.22** Matrika A je pozitivno definitna, kadar so vse njene vodilne glavne poddeterminante pozitivne.

**7.23** Če so stolpci matrike R linearno neodvisni, je matrika  $A = R^T R$  pozitivno definitna.

**7.24** Za vsako simetrično pozitivno definitno matriko A obstaja zgornjetrokotna matrika R, da je  $A = R^T R$ .

**7.25** Simetrična matrika reda  $n$ , ki ima eno od spodnjih lastnosti, ima tudi ostale štiri:

1. Vseh  $n$  pivotov je pozitivnih;

2. Vseh  $n$  vodilnih glavnih determinant je pozitivnih;

3. Vseh  $n$  lastnih vrednosti je pozitivnih;

4. Za vsak  $\bar{x} \neq \bar{0}$  je  $\bar{x}^T A \bar{x} > 0$ ;

5.  $A = R^T R$  za neko matriko R z linearno neodvisnimi stolpci.

**7.26** Vsako realno  $m \times n$  matriko A lahko zapisemo kot produkt  $A = UEV^T$ , kjer je matrika U ortogonalna  $m \times m$ , E diagonalna  $m \times n$  in V ortogonalna  $n \times n$ .

**7.27** Če je matrika A simetrična in so vsej njeni elementi realni, potem je njen rang enak številu nenicelnih lastnih vrednosti matrike A.

$$\text{rang}(A) = \text{število } \lambda A$$

**7.28 Diagonalizacija** oz *podobnost* matrik. Matriki A in B sta *podobni*, če imata obe iste lastne vrednosti. Diagonalno matriko sestavimo tako, da v njeno diagonalo vpisemo lastne vrednosti. Matriko P pa sestavimo iz njenih lastnih vektorjev; po stolpcih.

$$A = PDP^{-1} \text{ oz. } D = P^{-1}AP$$

**7.29 Spektralni razcep** Naj bodo vektorji  $\bar{q}_1, \dots, \bar{q}_n$  ONB iz l. vektorjev matrike A za l. vrednost  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ , potem lahko matriko A zapisemo kot:

$$A = \lambda_1 \bar{q}_1 \bar{q}_1^T + \dots + \lambda_n \bar{q}_n \bar{q}_n^T$$

### 7.30 Nekaj lastnosti simetričnih matrik

- Vse lastne vrednosti simetrične matrike so realne. Lastni vektorji realne simetrične matrike, ki pripadajo različnim lastnim vrednostim, so med seboj pravokotni.

- Vsako realno simetrično matriko A lahko zapisemo kot  $A = QDQ^T$ , kjer je Q ortogonalna matrika lastnih vektorjev, D pa diagonalna matrika, ki ima na diagonalni pripadajoče lastne vrednosti matrike A.